



Le vautour fauve (*Gyps fulvus*) est une espèce d'oiseau charognard de la famille des Accipitridae.

Comme la plupart des vautours de la famille gyps, le cou et la tête sont dénudés permettant de fouiller dans les carcasses sans se souiller les plumes.

Le poids moyen d'un vautour fauve est de 8 kilos et son envergure maximale de 2,65 mètres.

Le vautour fauve est un oiseau planeur; lourd et massif, il utilise les courants ascendants thermiques pour planer.

Montagnes, déserts et grandes étendues dégagées.

Animal social, le vautour fauve vit en groupe. Les colonies aiment avoir, près de leurs aires, des reposoirs où les grands oiseaux se rassemblent. Ces surfaces sont en général orientées au sud ou au sud-est. Elles sont situées entre 500 et 1 000 mètres d'altitude. Les vautours fauves restent en hauteur (falaises) pour profiter des courants d'air et s'élever sans fatigue.

Exclusivement charognard il se nourrit sur les carcasses de grand animaux qu'il détecte du haut du ciel grâce à sa vision adaptée. De nos jours, suite à la raréfaction ou la disparition des grands animaux sauvages (mouflons, chamois, bouquetins, aurochs) le vautour fauve se nourrit principalement d'animaux domestiques morts (moutons, vaches).

Souvent les grands corbeaux viennent les premiers sur la charogne. Ce sont d'excellents indicateurs pour les vautours, car, très farouches, ils ne se risquent à approcher une proie que quand il n'y a plus de danger. Il peut parcourir ainsi des centaines de kilomètres à la recherche de nourriture.